


46. Tussilago (hästhov) - *Tussilago farfara*

Hästhov, som är en korgblommig växt, är mer känd under sitt vetenskapliga släktesnamn *Tussilago* och ett mycket omtyckt, tidigt vårtecken. Den är mycket vanlig på näringsrik, gärna lerrik mark, där den sprider sig med hjälp av jordstammar. Blomkorgarna bildas redan under föregående sommar och kommer fram så fort som markytan värms upp i den första vårsolen. När blomningen är över vissnar blomstänglarna. Under sommaren ersätts de av stora, njurlika blad. Arten är vanlig i södra och mellersta Sverige. I norr är den mindre allmän.



Vi prioriterar rapportering av datum för start av **blomning**

Rapportera blomning.

Hästhov är en korgblommig växt. En korg består av många blommor tillsammans på ett plattat fäste. På utsidan av korgen sitter smala gröna holkfjäll med gröna spetsar som omsluter korgen i knoppläge. Du skall rapportera när 10-20 korgar öppnat sig så att de gula blommorna på fästets ovansida är synliga och korgen är mer eller mindre platt - fatlik. Efter blomningen sluter sig knoppen igen och stjälken böjer sig mot marken.



Rapportera 'blomning startar' när 10-20 korgar öppnat sig

Knopp-
läge



När blomningen
är över sluter sig
korgarna igen




De slutna korgarna
böjer sig mot marken
medan frukterna
utvecklas


Medan **blomning pågår** utvecklas blommorna i korgen

Hos hästhov är de tunglika blommorna i korgens periferi rent honliga. De innehåller var sin pistill med smala märkesflikar. Dessa blommor slår ut först.

På blomfästets centrala yta ("disken") finns många rörformiga blommor, som är hanliga. Förutom ståndare har de en rudimentär pistill, och de slår ut efter honblommorna.



Kännetecken



Bladen utvecklas inte förrän blomningen är över. De är stora och står kvar hela sommaren.

Bladen är tilltryckt vitludna på undersidan.



Korgarna har smala, nästan jämnhöga holkfjäll på ut-/undersidan. Stjälken är fjällig.

Honblommornas pistiller har mognat till nötter som var och en bär en hårpensel. Nu rätar stjälken upp sig efter att ha varit böjd under fruktutvecklingen.